

Note d'information Maladie Hémorragique Epizootique

Les signes cliniques qui doivent vous alerter :

1. Démarche raide, difficultés au déplacement +/- hyperthermie,
2. Apparition des signes au niveau de la face : conjonctivite, érosion +/- ulcères du mufle avec écoulements naseaux, ulcères des gencives rapidement nécrotiques et nauséabonds, atteintes de la langue fréquentes avec ulcères importants +/- œdèmes, cyanoses +/- paralysie,
3. Possibilité d'avortements, diarrhée +/- hémorragique, paralysie, dans des cas plus rares.

Utilisation des insecticides intéressante mais non efficace à 100% vu la durée d'incubation, en zone infectée intérêt de traiter les animaux malades pour essayer de limiter la contamination.

Il est nécessaire de contacter votre vétérinaire sanitaire pour voir le protocole et les obligations à suivre.

SURTOUT : surveillance matin et soir car évolution possible en 12h et plus les animaux sont pris en charge tôt, meilleur est le résultat.

En complément, rentrer les animaux ou donner du foin dehors car impossibilité d'arracher l'herbe (douleur+++).

AUCUN RISQUE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE - NON TRANSMISSIBLE A L'HOMME

Les petits ruminants semblent être moins impactés par une expression clinique de la maladie.

Nous vous tiendrons informés des prochaines évolutions.

